

GUANO COMPOSTADO DE POLLO

Biofertilizante Estabilizado de Alta Eficiencia Nutritiva y Biológica

45.0% – 55.0%

MATERIA ORGÁNICA TOTAL (MS)

2.5% – 3.5%

NITRÓGENO ORGÁNICO (N)

12 : 1 – 15 : 1

RELACIÓN C / N ESTABILIZADA

100% Inocuo

LIBRE DE SEMILLAS Y PATÓGENOS

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS Y FÍSICO-BIOLÓGICAS

Parámetro / Análisis	Rango Típico / Valor	Unidad / Observación
Materia Orgánica (M.O.)	45,0% – 55,0%	Base seca (Proceso compostaje aeróbico)
Nitrógeno Total (N)	2,5% – 3,5%	Liberación gradual y sostenida
Fósforo Asimilable (P ₂ O ₅)	2,0% – 3,0%	Nutrición radicular clave
Potasio (K ₂ O)	1,5% – 2,5%	Aporte de vigor y calidad de fruta
Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)	12 : 1 – 15 : 1	Garantía de madurez y estabilidad
pH (1:5)	7,0 – 8,0	Ligeramente alcalino a neutro
Humedad	20,0% – 25,0%	Fácil manipulación y aplicación
Estado Sanitario	Sanitizado Térmicamente	Ausencia de <i>Salmonella</i> y <i>E. coli</i>

BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Acondicionamiento Integral del Suelo: Reactiva la microbiología benéfica, mejorando la porosidad, la tasa de infiltración de agua y la estructura en suelos compactados o exhaustos.

Biofertilización Sustentable: Suministra un balance óptimo de N-P-K orgánico y micronutrientes, previniendo pérdidas por lixiviación y promoviendo una asimilación eficiente por las raíces.

- Frutales y Cerezos:** 3 – 8 kg/árbol según edad, aplicado en la proyección de la copa antes de la brotación.
- Hortalizas y Cultivos en Línea:** 3 – 6 ton/ha incorporado localizadamente previo al trasplante o siembra.
- Praderas y Recuperación de Suelos:** 2 – 5 ton/ha distribuidos al voleo para regenerar la capa arable.
- Inocuidad Garantizada:** Sometido a compostaje controlado a alta temperatura (>55 °C), eliminando cualquier riesgo fitosanitario o de semillas de malezas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Tierra Fértil SpA

Sitio Web Oficial

Atención Comercial